

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 15-7-87481780



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGIO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 100
du 4 Juin 1987

VIGNE

**** Mildiou : traitement avant floraison**

A l'approche de la floraison, il est recommandé d'effectuer un traitement anti-mildiou, la vigne étant en effet particulièrement sensible pendant cette période. Préférez un produit systémique qui vous assurera une protection de 12 à 14 jours. Vous avez le choix entre :

--> Les spécialités à base de phosethyl - al
dose en l ou kg/ha

Alliance	3
Mikal	3
Rhodax	4,5
Valiant	3

--> Les spécialités à base de phénylamides
dose en l ou kg/ha

Acylon super F	3
Caltan	2,5
Caltan C	2,5
Pulsan	2,5
Sirdate	2,5
Tairel F	2,4
Tairel M	2,5
Vamin	2,5

**** Oïdium : restez vigilants**

Les cépages sensibles doivent continuer à être protégés.

Préférez un soufrage en pleine floraison.
Il a une action favorable sur la fécondation.
Il a une action secondaire efficace contre
les acariens.

**** Cochenilles farineuses de la vigne : sortie des larves**

Vous avez pu les remarquer l'an dernier dans certaines parcelles = petites et blanches, elles envahissent les grappes et les pieds atteints noircissent car ils sont couverts de fumagine. Les jeunes larves sortent depuis cette semaine. Prévoir un traitement sur les pieds touchés dans la semaine du 15 au 20 juin. Visez le bas du feuillage. Vous pouvez utiliser :

- ULTRACIDE
- EKALUX
- ou des spécialités à base de parathion

**** Tordeuses de la grappe**

Le vol se termine. Le nombre de glomérules augmente, mais ne justifie toujours pas un traitement.

AGRUMES

Pucerons, cochenilles aleurodes

--> De nombreuses colonies de **pucerons noirs** et **verts** sont visibles sur les jeunes pousses. Intervenez dès maintenant avec un acaricide spécifique à base de pirimicarbe ou de vamidothion.

--> Les sorties de jeunes larves de **cochenilles virgules** et **serpettes** débutent dans les vergers. Attendre un prochain avis pour intervenir afin de pouvoir atteindre un maximum de population.

--> Les vols d'aleurodes sont importants dans les vergers de CASINCA, MARANA, ALERIA depuis le 15 mai. Les pontes sont déjà nombreuses. Intervenez après la floraison avec un produit à base de méthidation ou de methomyl.

ARBRES FRUITIERS = Traitement de conservation

la récolte débute pour les variétés précoces. Les maladies de conservation sont fréquentes (monilia, botrytis, gleosporium :) Le développement de ces maladies se réalise pendant la conservation, mais la contamination se fait au verger. Elle est favorisée par les coups et blessures sur fruit pendant la récolte et les manutentions. Deux traitements sont nécessaires.

- 20 à 25 jours avant la récolte
- 7 jours avant la récolte

PRODUITS UTILISABLES

- | | |
|----------------|-------------------------|
| - benomyl | BENLATE |
| - captane | N.S. |
| - captafol | DIFOSAN, ORTHODIFOLATAN |
| - tolyfluanide | EUPARENE |